

Thiovit® Liquid

Fongicide, Acaricide



Fongicide et acaricide biologique concentré à diluer et pulvériser, contre les maladies fongiques et les acariens dans de nombreuses cultures.

- › Préparation de soufre liquide
- › Pour les vignes, les fruits, les baies
- › Action 2 en 1 contre les maladies fongiques et les acariens
- › Également pour les légumes
- › Matière active 100 naturelle

Tomates, Tomates rondes en vrac, Tomates à grappes, Tulipe, Vignes, Viticulture, Épicéa commun



Domaines d'application

Abricotier, Ail des ours, Aneth, Arbres de Noël, Arbres et arbustes (hors forêt), Armoise commune, Azalée, Basilic, Bourrache, Buis, Bégonia, Carvi, Cerfeuil, Cerisier, Cerisier acide, Cerisier doux, Chardon bleu, Chrysanthème, Ciboulette, Coing, Concombre de serre, Concombre nostrano, Concombres, Conifères, Cornichons, Cornouiller mâle, Courge d'ornement, Courges (écorce non comestible), Courges oléagineuses, Courges à peau comestible, Courgette, Cucurbitacées (concombre, courge, melon ...), Cultures florales et plantes vertes, Cyclamen, Estragon, Fines herbes, Fraisiers, Fraisiers, Fraisiers, Fruits à noyau, Fruits à pépins, Genévrier, Gerbera, Glaiéul, Groseilles à maquereau, Géranium, Iris, Jacinthes, Laurier-cerise, Liliacées (plantes ornementales), Livèche, Marjolaine, Marronnier d'Inde, Melons, Mélisse, Mûriers, Néflier, Oeillet, Origan, Pastèque, Persil, Pinacées (Pinaceae), Poirier/nashi, Pomme, Primevères, Prune/pruneau, Pâtisson, Pêches/nectarines, Rhododendron, Romarin, Rondini, Rosiers, Sapin bleu, Sapin de Nordmann, Sarriette, Saugue, Spécialités de tomates, Thuyas/juniperus, Thym, Tomato cerise,

Thiovit® Liquid

Fongicide, Acaricide



Application

Généralité: composition de la bouillie - remplir la cuve aux deux tiers avec de l'eau. Agiter vigoureusement Thiovit Liquid avant utilisation, puis verser dans le réservoir du pulvérisateur en remuant continuellement. Compléter ensuite avec de l'eau et laisser le mélangeur fonctionner jusqu'à la fin du traitement. Pour les mélanges avec des formulations solides, commencer toujours par verser lentement les poudres ou les granulés en premier dans la cuve. Ajouter Thiovit Liquid seulement après la dissolution complète des éléments solides. Ajouter l'engrais liquide et l'agent mouillant à la fin. Ne pas traiter à midi, en cas de fort ensoleillement et de températures élevées (> 25 °C). Lire les remarques sur la compatibilité des variétés pour les cultures.

Baies

Mûre: contre les ériophyides gallicoles pour l'application en forme d'une pulvérisation au débourrement 2 % à un dosage de 20 ml du produit/10 m² (20 ml/l d'eau pour 10 m²) et pour l'application après le débourrement (longueur des pousses 10–15 cm) 1 % à un dosage de 10 ml du produit/10 m² (10 ml/l d'eau pour 10 m²). Dans la phase suivant le débourrement et en cas de forte infestation, on peut également procéder à un second traitement. Pour les mûres, le dosage indiqué se réfère au stade «début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1 l/10 m². Conformément aux instructions de l'OFAG, le dosage doit être adapté au stade de la culture à traiter.

Fraise: contre l'oïdium 0,2–0,4 % à un dosage de 2–4 ml/10 m² (20–40 ml/10 l d'eau pour 100 m²). Pas de traitement entre la floraison et jusqu'à la fin de la récolte. Le dosage indiqué se réfère au stade «pleine floraison» et «début de la coloration rouge des fruits», 4 plants par m²; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1 l/10 m². Conformément aux instructions de l'OFAG, le dosage doit être adapté au stade de la culture à traiter.

Groseilles à maquereau: contre l'oïdium 0,2–0,5 % à un dosage de 2–5 ml/10 m² (20–50 ml/10 l d'eau pour 100 m²). Le dosage indiqué se réfère au stade «mise à fruits (50–90 % des inflorescences ont des fruits visibles)»; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1 ml/10 m². Conformément aux instructions de l'OFAG, le dosage doit être adapté au stade de la culture à traiter.

Fruits

Arboriculture en général: le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10 m³/10 m². Conformément aux instructions de l'OFAG, le dosage doit être adapté au volume des arbres. Dosage plus élevé en cas de forte attaque.

Poirier, nashi: contre l'ériophyides gallicoles 2 % à un dosage de 32 ml du produit/10 m² (20 ml/l d'eau pour 10 m³/10 m²) et application après la récolte sans délai d'attente.

Fruits à pépins: contre l'oïdium, la tavelure des arbres fruitiers à pépins (effet partiel) et ériophyides libres (effets secondaires): application au débournement 0,75 % à un dosage de 12 ml du produit/10 m² (75 ml/10 l d'eau pour 100 m³/100 m²), application: avant la floraison 0,5–0,75 % à un dosage de 8–12 ml du produit/10 m² (50–75 ml/10 l d'eau pour 100 m³/100 m²), application après la floraison 0,3–0,5 % à un dosage de 4,8–8 ml du produit/10 m² (30–50 ml/10 l d'eau pour 100 m³/100 m²). Traitements post-floraux uniquement sur les variétés supportant le soufre.

Pêcher, nectarine: contre l'oïdium, la tavelure des pêcher 0,3–0,5 % à un dosage de 4,8–8 ml du produit/10 m² (30–50 ml/10 l d'eau pour 100 m³/100 m²). Application après la floraison. Délai d'attente 3 semaines.

Fruits à noyaux: contre la maladie criblée et ériophyides libres (effets secondaires): application avant la floraison 0,75 % à un dosage de 12 ml du produit/10 m² (75 ml/10 l d'eau pour 100 m³/100 m²) sans délai d'attente, application après la floraison 0,3–0,5 % un dosage de 4,8–8 ml du produit/10 m² (30–50 ml/10 l d'eau pour 100 m³/100 m²) avec délai d'attente 3 semaines.

Viticulture

Vigne: contre l'acariose de la vigne et l'érinose de la vigne 2 % à un dosage de 16 ml du produit/10 m² (20 ml/l d'eau pour 10 m²). Application comme pulvérisation au débournement. Le dosage mentionné se réfère au stade 5 feuilles étalées jusqu'au début de la formation des fleurs (15–51 = F) avec une quantité de bouillie de référence de 0,8 l/10 m² (base de calcul).

Vigne: contre l'oïdium de la vigne 0,1–0,4 % à un dosage de 1,6–6,4 ml du produit/10 m² (10–40 ml/10 l d'eau pour 45 m³ volume de la haie foliaire /100 m²). Application comme traitements pré- et post-floraux jusqu'à mi-août au plus tard. Délai d'attente: 3 semaines. Le dosage mentionné se réfère au stade fruits noués jusqu'au début de la maturité (BBCH 71–81 = J–M, post floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1,6 l/10 m² (base de calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4,5 m³/10 m². Conformément aux instructions de l'OFAG, le dosage doit être adapté au volume de la haie foliaire. Le dosage plus élevé en cas de forte attaque.

Légumes

Culture maraîchère en général: la dosage plus élevé en cas de forte attaque.

Fines herbes: contre l'oïdium 2 ml/10 m² (2 ml/l d'eau pour 10 m²). Délai d'attente 14 jours.

Cucurbitacées: contre l'oïdium 0,1–0,2 % à une dosage de 1–2 ml/10 m² (1–2 ml/l d'eau pour 10 m²). Délai d'attente 3 jours.

Tomate: contre l'oïdium 0,1–0,2 % (1–2 ml/l d'eau). Délai d'attente 3 jours. 3 traitements au maximum par année ou par culture.

Plantes ornementales (plain air)

Arbres et arbustes hors forêt, cultures florales et plantes vertes: contre l'oïdium 0,2 % (20 ml/10 l d'eau).

Laurier-cherise: contre la maladie ciblée des Prunus 0,2 % (20 ml/10 l d'eau).

Période d'application

février – octobre

Effet

Thiovit Liquid est un fongicide biologique à base de soufre. Le soufre agit

Thiovit® Liquid

Fongicide, Acaricide



d'une part préventivement contre les maladies fongiques et d'autre part il inhibe la formation des corps des champignons. Le soufre est également un élément nutritif indispensable servant à la formation de protéines, enzymes, vitamines et régulateurs de croissance vitaux pour la plante. Le soufre contribue à la synthèse de la chlorophylle, il donne des plantes robustes et de plus beaux fruits.

A noter

Autorisé pour l'utilisation non professionnelle. Préparation et application de la bouillie: Porter des lunettes de protection ou une visière. Utiliser exclusivement avec une cuve avec appareil de brassage en marche.

L'emballage vide doit être deux fois rincé à l'eau, avant qu'il ne puisse être mis au rebut. À des températures diurnes supérieures à 25 °C, il existe un risque de phytotoxicité pour les plantes ornementales.

La réutilisation de l'emballage est interdite.



Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Dimensions des emballages



Füllmenge:
100 ml; pour 5-100 l

Danger

Provoque de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Mettre les récipients vidés et nettoyés à la déchetterie. Déposer les résidus dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de ventes de ces produits.

Contenu

51,1 % (700 g/l) soufre

Numéro d'agrément

W-5323-2

Artikel-Nummer:
208171

EAN:
7640185981713

Thiovit® Liquid

Fongicide, Acaricide



Agit sur les dommages suivants

Erinose de la vigne



Maladie criblée




Oïdium



Phytoptes de l'acariose de la vigne



Phytoptes du poirier



Tavelure



Tavelure noire du pêcher

