

Ramor® G - ricarica

Biozida



Esche in granuli di grano pronte all'uso da riempire e posizionare per combattere i topi e ratti dentro e fuori casa.

- > Pronto all'uso
- > Per tutte le comuni scatole per esche



Coltura

Casa e edificio

Impiego

Dosi e frequenza d'impiego

Topo domestico (*Mus musculus*) – uso all'interno degli edifici: Forte infestazione: fino a 50 g di esca per punto esca, ogni 2 m. Debole infestazione: fino a 50 g di esca per punto esca, ogni 5 m. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e, in seguito, almeno settimanalmente; ciò al fine di verificare l'integrità del contenitore, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Reintegrare nuovamente il contenitore quando necessario. Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) – (Uso all'interno degli edifici): Forte infestazione: fino a 100 g di esca per punto esca, ogni 5 m. Debole infestazione: fino a 100 g di esca per punto esca, ogni 10 m. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e, in seguito, almeno settimanalmente; ciò al fine di verificare l'integrità del contenitore, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Reintegrare nuovamente il contenitore quando necessario.

Informazioni supplementari

A causa della loro modalità d'azione ritardata, i rodenticidi anticoagulanti possono richiedere dai 4 ai 10 giorni dopo l'assunzione dell'esca per essere efficaci. I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude: per il loro smaltimento, utilizzare guanti o strumenti quali pinze. Questo prodotto contiene un agente amaricante ed un colorante.

Periodo di applicazione

gennaio – dicembre

Azione

Ramor G è un'esca rodenticida pronta all'uso in grano in sacchetti 25 g per il controllo d'infestazioni da topo domestico (*Mus musculus*) e ratto grigio (*Rattus norvegicus*), a tutti gli stadi di sviluppo, contenente un principio attivo altamente potente, il Brodifacoum, anticoagulante di 2° generazione che agisce anche con una singola ingestione. Grazie alla sua modalità d'azione, la morte dei roditori avviene senza destare alcun sospetto verso l'esca da parte degli altri componenti della colonia. Ramor G si presenta sotto forma di esca in grano decorticato, particolarmente appetibile per le specie di roditori sopra-indicate perché arricchito con componenti alimentari e realizzato con la speciale Tecnologia SAT (Special Absorption Technology) che permette un'omogenea distribuzione del principio attivo all'esterno e all'interno del chicco di grano.

Questa esca è ideale per trattamenti in situazioni in cui la dieta dei roditori sia prevalentemente legata al consumo di granaglie, come ad esempio, in edifici rurali e zootecnici.

Ramor® G - ricarica

Biozida



Ramor G contiene una sostanza amaricante (Denatonium Benzoate) atta a ridurre il rischio d'ingestione accidentale da parte di bambini.

Commenti

Attenzione

Prima dell'uso leggere e seguire le istruzioni sul prodotto così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita. Considerare meccanismi di controllo non-chimico (ad esempio trappole) prima di utilizzare prodotti rodenticidi. Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca. I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.). Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture. Non aprire i sacchetti contenenti l'esca. Posizionare i contenitori per esca fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non bersaglio. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente dentro a contenitori per esche a prova di manomissione. Posizionare i contenitori per esca lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto. Non porre i contenitori per esche accanto a sistemi di drenaggio delle acque poiché l'esca potrebbe entrare in contatto con l'acqua. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto. Alla fine del periodo di trattamento, rimuovere le esche rimaste o i contenitori contenenti le esche.

Misure di mitigazione del rischio
Considerare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione

Confezioni



Füllmenge:
150 g; per 3 punti di esca sui 6–15 m

Artikel-Nummer:
208179

EAN:
7640185981799

del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuovere potenziali fonti di cibo e beveraggio quanto più possibile). Non utilizzare i rodenticidi anticoagulanti come esche permanenti (ad esempio per prevenire eventuali infestazioni o per monitorare attività dei roditori). L'utilizzo di questo prodotto dovrebbe eliminare i roditori entro 35 giorni. In caso di sospetta inefficacia al termine del trattamento (ad esempio nel caso in cui si osservi ancora attività di roditori), contattare il fornitore del prodotto o chiamare un Servizio di disinfestazione. Verificare la presenza di roditori morti e rimuoverli durante il trattamento, almeno con la stessa frequenza di visita dei contenitori per esche. Smaltire gli animali morti nel punto di raccolta locale delle carcasse di animali o con i rifiuti urbani.

È vietato il riutilizzo della confezione.

Scadenza: 2 anni a partire dalla data di produzione.



Attenzione

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Può provocare danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare la polvere. In caso di malessere, consultare un medico. Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico / veterinario. Conservare sotto chiave. Riportare il contenuto / recipiente e le esche inutilizzate al punto di vendita o in un punto di raccolta di rifiuti speciali.

Contenuto

0,0029 % w/w (0,029 mg/g) Brodifacoum (CAS N° 56073-10-0)

Numero di approvazione

CH-2017-0028

Ramor[®] G - ricarica

Biozida



Efficace in caso di

Ratti



Topi / arvicole

